

Здорова новонароджена
дитина

6 завдань

1. У доношеного хлопчика після виписки з пологового будинку при первинному патронажі педіатр виявив симетричну припухлість молочних залоз без змін шкіри над ними, набряк калитки. Температура тіла $36,5^{\circ}\text{C}$. Дитина спокійна, груди матері смокче активно. Про який стан слід подумати?

У доношеного хлопчика після виписки з пологового будинку при первинному патронажі педіатр виявив **симетричну припухлість молочних залоз без змін шкіри над ними, набряк калитки**. Температура **тіла 36,5°C**. Дитина спокійна, груди матері смокче активно. Про який стан слід подумати?

- A. Статевий криз новонародженого
- B. Мастит новонародженого
- C. Патологія уrogenітальної системи
- D. Порушення електролітного обміну
- E. Захворювання ендокринної системи

У доношеного хлопчика після виписки з пологового будинку при первинному патронажі педіатр виявив **симетричну припухлість молочних залоз без змін шкіри над ними, набряк калитки**. Температура тіла **36,5°C**. Дитина спокійна, груди матері смокче активно. Про який стан слід подумати?

A. Статевий криз новонародженого

B. Мастит новонародженого

C. Патологія уrogenітальної системи

D. Порушення електролітного обміну

E. Захворювання ендокринної системи

2. Доношений хлопчик народився з масою тіла 3200 г, довжиною тіла 52 см. При огляді на 3 добу шкіра набула жовтушного відтінку. Дитина активно смокче, сон не порушений. Живіт м'який, печінка виступає на 2 см з під реберної дуги. В аналізі крові: гемоглобін – 200 г/л, еритроцити – $5,5 \cdot 10^{12}/\text{л}$, тромбоцити – $200 \cdot 10^9/\text{л}$, загальний білірубін – 52 мкмоль/л. Про який стан слід подумати?

Доношений хлопчик народився з масою тіла 3200 г, довжиною тіла 52 см. При огляді **на 3 добу** шкіра набула **жовтушного відтінку**. Дитина **активно смокче, сон не порушений**. Живіт м'який, печінка виступає на 2 см з під реберної дуги. В аналізі крові: гемоглобін – 200 г/л, еритроцити – $5,5 \cdot 10^{12}/\text{л}$, тромбоцити – $200 \cdot 10^9/\text{л}$, загальний білірубін – 52 мкмоль/л. Про який стан слід подумати?

- А. Фізіологічна жовтяниця
- В. Вроджений гепатит
- С. Гемолітична хвороба
- Д. Геморагічна хвороба
- Е. Вроджений цироз

Доношений хлопчик народився з масою тіла 3200 г, довжиною тіла 52 см. При огляді **на 3 добу** шкіра набула **жовтушного відтінку**. Дитина **активно смоче, сон не порушений**. Живіт м'який, печінка виступає на 2 см з під реберної дуги. В аналізі крові: гемоглобін – 200 г/л, еритроцити – $5,5 \cdot 10^{12}/\text{л}$, тромбоцити – $200 \cdot 10^9/\text{л}$, загальний білірубін – 52 мкмоль/л. Про який стан слід подумати?

A. Фізіологічна жовтяниця

B. Вроджений гепатит

C. Гемолітична хвороба

D. Геморагічна хвороба

E. Вроджений цироз

3. У дівчинки на 5-й добі життя з'явилися кров'янисті виділення з піхви. Об'єктивно: дитина активна, сон спокійний. Над легенями дихання пуерильне, тони серця ритмічні, звучні. Живіт м'який, печінка виступає з під реберної дуги на 2 см. Стілець – 4 рази на добу, без патологічних домішків. Який найбільш вірогідний діагноз?

У дівчинки на 5-й добі життя з'явились кров'янисті виділення з піхви. Об'єктивно: дитина активна, сон спокійний. Над легеньми дихання пуерильне, тони серця ритмічні, звучні. Живіт м'який, печінка виступає з під реберної дуги на 2 см. Стілець – 4 рази на добу, без патологічних домішків. Який найбільш вірогідний діагноз?

- А. Фізіологічна метрорагія новонародженого
- В. Геморагічна хвороба новонародженого
- С. Десквамативний вульвовагініт
- Д. Сечокислий інфаркт новонародженого
- Е. Фізіологічний дисбактеріоз кишечника

У дівчинки на 5-й добі життя з'явились кров'янисті виділення з піхви. Об'єктивно: дитина активна, сон спокійний. Над легеньми дихання пуерильне, тони серця ритмічні, звучні. Живіт м'який, печінка виступає з під реберної дуги на 2 см. Стілець – 4 рази на добу, без патологічних домішків. Який найбільш вірогідний діагноз?

А. Фізіологічна метрорагія новонародженого

В. Геморагічна хвороба новонародженого

С. Десквамативний вульвовагініт

Д. Сечокислий інфаркт новонародженого

Е. Фізіологічний дисбактеріоз кишечника

4. При огляді новонародженої дитини лікар не зміг пропальпувати у нього периферичні лімфатичні вузли. З чим найбільш вірогідно це пов'язано?

При огляді новонародженої дитини лікар **не зміг пропальпувати у нього периферичні лімфатичні вузли**. З чим найбільш вірогідно це пов'язано?

- A. Слабка вираженість капсули лімфатичних вузлів
- B. Глибоке залягання лімфатичних вузлів
- C. Добрий розвиток підшкірної клітковини в місцях накопичення лімфатичних вузлів
- D. Вплив фізіологічної м'язової гіпертонії
- E. Відсутність лімфатичних вузлів у цьому віці

При огляді новонародженої дитини лікар **не зміг пропальпувати у нього периферичні лімфатичні вузли**. З чим найбільш вірогідно це пов'язано?

- A. **Слабка вираженість капсули лімфатичних вузлів**
- B. Глибоке залягання лімфатичних вузлів
- C. Добрий розвиток підшкірної клітковини в місцях накопичення лімфатичних вузлів
- D. Вплив фізіологічної м'язової гіпертонії
- E. Відсутність лімфатичних вузлів у цьому віці

5. Доношена дитина, народилась з масою тіла 3200 г, довжиною тіла 50 см, з оцінкою за шкалою Апгар 8-10 балів. Який оптимальний строк першого прикладання до грудей ?

Доношена дитина, народилась з масою тіла 3200 г, довжиною тіла 50 см, з оцінкою за шкалою Апгар 8-10 балів. Який оптимальний строк першого прикладання до грудей ?

- A. В перші 30 хвилин
- B. В перші 6 годин
- C. В перші 24 години
- D. В перші 48 годин
- E. Після 48 годин

Доношена дитина, народилась з масою тіла 3200 г, довжиною тіла 50 см, з оцінкою за шкалою Апгар 8-10 балів. Який оптимальний строк першого прикладання до грудей?

- A. В перші 30 хвилин
- B. В перші 6 годин
- C. В перші 24 години
- D. В перші 48 годин
- E. Після 48 годин

6. Дитина народилась у 40 тижнів гестації з масою 3 700 г. За шкалою Апгар – 7/9 балів. Прикладалася до грудей одразу після пологів смоктала активно. На третю добу життя маса тіла 3 600 г. Який транзиторний стан спостерігається у дитини?

Дитина **народилась** у 40 тижнів гестації **з масою 3 700 г**. За шкалою Апгар – 7/9 балів. Прикладалася до грудей одразу після пологів смоктала активно. На **третю добу життя маса тіла 3 600 г**. Який транзиторний стан спостерігається у дитини?

- A. Фізіологічна втрати маси тіла
- B. Токсична еритема
- C. Фізіологічна жовтяниця
- D. Сечокислий інфаркт
- E. Транзиторний дисбактеріоз

Дитина **народилась** у 40 тижнів гестації **з масою 3 700 г**. За шкалою Апгар – 7/9 балів. Прикладалася до грудей одразу після пологів смоктала активно. На **третю добу життя маса тіла 3 600 г**. Який транзиторний стан спостерігається у дитини?

A.Фізіологічна втрати маси тіла

B.Токсична еритема

C.Фізіологічна жовтяниця

D.Сечокислий інфаркт

E.Транзиторний дисбактеріоз