

1. У доношеного хлопчика після виписки з пологового будинку при первинному патронажі педіатр виявив симетричну припухлість молочних залоз без змін шкіри над ними, набряк калитки. Температура тіла $36,5^{\circ}\text{C}$. Дитина спокійна, груди матері смоче активно. Про який стан слід подумати?

- A. Статевий криз новонародженого
- B. Мастит новонародженого
- C. Патологія уrogenітальної системи
- D. Порушення електролітного обміну
- E. Захворювання ендокринної системи

2. Доношений хлопчик народився з масою тіла 3200 г, довжиною тіла 52 см. При огляді на 3 добу шкіра набула жовтушного відтінку. Дитина активно смоче, сон не порушений. Живіт м'який, печінка виступає на 2 см з під реберної дуги. В аналізі крові: гемоглобін – 200 г/л, еритроцити – $5,5 \cdot 10^{12}/\text{л}$, тромбоцити – $200 \cdot 10^9/\text{л}$, загальний білірубін – 52 мкмоль/л. Про який стан слід подумати?

- A. Фізіологічна жовтяниця
- B. Вроджений гепатит
- C. Гемолітична хвороба
- D. Геморагічна хвороба
- E. Вроджений цироз

3. У дівчинки на 5-й добі життя з'явилися кров'янисті виділення з піхви. Об'єктивно: дитина активна, сон спокійний. Над легенями дихання пуерильне, тони серця ритмічні, звучні. Живіт м'який, печінка виступає з під реберної дуги на 2 см. Стілець – 4 рази на добу, без патологічних домішків. Який найбільш вірогідний діагноз?

- A. Фізіологічна метрорагія новонародженого
- B. Геморагічна хвороба новонародженого
- C. Десквамативний вульвовагініт
- D. Сечокислий інфаркт новонародженого
- E. Фізіологічний дисбактеріоз кишечника

4. При огляді новонародженої дитини лікар не зміг пропальпувати у нього периферичні лімфатичні вузли. З чим найбільш вірогідно це пов'язано?

- A. Слабка вираженість капсули лімфатичних вузлів
- B. Глибоке залягання лімфатичних вузлів
- C. Добрий розвиток підшкірної клітковини в місцях накопичення лімфатичних вузлів
- D. Вплив фізіологічної м'язової гіпертонії
- E. Відсутність лімфатичних вузлів у цьому віці

5. Доношена дитина, народилась з масою тіла 3200 г, довжиною тіла 50 см, з оцінкою за шкалою Апгар 8-10 балів. Який оптимальний строк першого прикладання до грудей?

- A. В перші 30 хвилин
- B. В перші 6 годин
- C. В перші 24 години
- D. В перші 48 годин
- E. Після 48 годин

6. Дитина народилась у 40 тижнів гестації з масою 3 700 г. За шкалою Апгар – 7/9 балів. Прикладалася до грудей одразу після пологів смоткала активно. На третю добу життя маса тіла 3 600 г. Який транзиторний стан спостерігається у дитини?

- A. Фізіологічна втрати маси тіла
- B. Токсична еритема

С.Фізіологічна жовтяниця
D.Сечокислий інфаркт
Е.Транзиторний дисбактеріоз