

Асфіксія новонародженого.
Первинна реанімація
новонароджених.

7 завдань

У новонародженого, що переніс асфіксію у пологах, на 3-тю добу життя з'явилася кровотеча з пупкової ранки. Лабораторно - гіпокоагуляція, тромбоцитопенія, гіпотромбінемія. Чим зумовлені клініко-лабораторні зміни?

У новонародженого, що переніс асфіксію у пологах, на 3-тю добу життя з'явилася **кровотеча з пупкової ранки**. Лабораторно - **гіпокоагуляція, тромбоцитопенія, гіпотромбінемія**. Чим зумовлені клініко-лабораторні зміни?

- А. ДВЗ-синдромом
- В. Геморагічною хворобою новонароджених
- С. Вродженою ангіопатією
- Д.Тромбоцитопенічною пурпурою
- Е. Травмою пупкової судини

У новонародженого, що переніс асфіксію у пологах, на 3-тю добу життя з'явилася **кровотеча з пупкової ранки**. Лабораторно - **гіпокоагуляція, тромбоцитопенія, гіпотромбінемія**. Чим зумовлені клініко-лабораторні зміни?

- A. **ДВЗ-синдромом**
- B. Геморагічною хворобою новонароджених
- C. Вродженою ангіопатією
- D. Тромбоцитопенічною пурпурою
- E. Травмою пупкової судини

У новонародженого спостерігається частота дихання 26 за хв., ЧСС 90 за хв., шкіра синя, м'язовий тонус низький, на відсмоктування катетером із носа та рота слизі та навколоплідних вод дитина реагує гримасою. Рефлекси знижені. Аускультативно над легенями ослаблене везикулярне дихання. Тони серця звучні. Через 5 хвилин дихання ритмічне, 38 за 1 хв., ЧСС 120 за хв. Який найбільш імовірний діагноз?

У **новонародженого** спостерігається частота дихання 26 за хв., **ЧСС 90 за хв., шкіра синя, м'язовий тонус низький**, на відсмоктування катетером із носа та рота слизі та навколоплідних вод дитина реагує гримасою. **Рефлекси знижені**. Аускультативно над легеньми ослаблене везикулярне дихання. Тони серця звучні. Через 5 хвилин дихання ритмічне, 38 за 1 хв., ЧСС 120 за хв. Який найбільш імовірний діагноз?

- А. Асфіксія
- В. Внутрішньомозковий крововилив
- С. Вроджена вада серця
- Д. Гемолітична хвороба
- Е. Пологова травма

У **новонародженого** спостерігається частота дихання 26 за хв., **ЧСС 90 за хв., шкіра синя, м'язовий тонус низький**, на відсмоктування катетером із носа та рота слизі та навколоплідних вод дитина реагує гримасою. **Рефлекси знижені**. Аускультативно над легеньми ослаблене везикулярне дихання. Тони серця звучні. Через 5 хвилин дихання ритмічне, 38 за 1 хв., ЧСС 120 за хв. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Асфіксія

B. Внутрішньомозковий крововилив

C. Вроджена вада серця

D. Гемолітична хвороба

E. Пологова травма

У новонародженого ЧСС 70 за хв., проведена ШВЛ із застосуванням маски та мішка Амбу. Через 30 секунд серцевий ритм не змінився. Яким повинен бути наступний крок реанімаційних заходів?

У новонародженого ЧСС 70 за хв., проведена ШВЛ із застосуванням маски та мішка Амбу. Через 30 секунд серцевий ритм не змінився. Яким повинен бути наступний крок реанімаційних заходів?

- А. Непрямий масаж серця
- В. Соди гідрокарбонат внутришньовенно
- С. Тактильна стимуляція
- Д. Епінефрін внутришньовенно
- Е. Продовжити вентиляцію

У новонародженого ЧСС 70 за хв., проведена ШВЛ із застосуванням маски та мішка Амбу. Через 30 секунд серцевий ритм не змінився. Яким повинен бути наступний крок реанімаційних заходів?

А. Непрямий масаж серця

В. Соди гідрокарбонат внутришньовенно

С. Тактильна стимуляція

Д. Епінефрін внутришньовенно

Е.Продовжити вентиляцію

Дитина народилася від III-ї вагітності, II-х пологів. Вагітність протікала на фоні анемії, гестозу II половини. Термін гестації 35 тижнів, з масою - 2200,0; довжиною - 45 см. Оцінка за шкалою Апгар 6/7 балів. Через 6 годин появилися дихальні розлади: парадоксальне дихання, різке втягнення міжреберних проміжків, западіння грудини, виражений перинатальний ціаноз, западіння нижньої щелепи, при аускультатії - подовжений видих. В скільки балів за шкалою Сільвермана треба оцінити дитину?

Дитина народилася від III-ї вагітності, II-х пологів. Вагітність протікала на фоні анемії, гестозу II половини. Термін гестації 35 тижнів, з масою - 2200,0; довжиною - 45 см. Оцінка за шкалою Апгар 6/7 балів. Через 6 годин появились дихальні розлади: парадоксальне дихання, різке втягнення міжреберних проміжків, западіння грудини, виражений перинатальний ціаноз, западіння нижньої щелепи, при аускультатії - подовжений видих. В скільки балів за шкалою Сільвермана треба оцінити дитину?

A. 8 балів

B. 4 бали

C. 5 балів

D. 6 балів

E. 7 балів

Дитина народилася від III-ї вагітності, II-х пологів. Вагітність протікала на фоні анемії, гестозу II половини. Термін гестації 35 тижнів, з масою - 2200,0; довжиною - 45 см. Оцінка за шкалою Апгар 6/7 балів. Через 6 годин появились дихальні розлади: парадоксальне дихання, різке втягнення міжреберних проміжків, западіння грудини, виражений перинатальний ціаноз, западіння нижньої щелепи, при аускультації - подовжений видих. В скільки балів за шкалою Сільвермана треба оцінити дитину?

A. 8 балів

B. 4 бали

C. 5 балів

D. 6 балів

E. 7 балів

Дитина народилася при терміні гестації 30 тижнів, з масою - 1100,0, через 3 години після народження з'явилися часті апное, дихання по типу "gasps", ЧСС 98 в хв. Оцінка за шкалою Сільвермана 9 балів. Додаткова оксигенація не привела до покращення стану. Що необхідно зробити?

Дитина народилася при **терміні гестації 30 тижнів**, з масою - 1100,0, через 3 години після народження з'явилися **часті апное, дихання по типу "gasps", ЧСС 98** в хв. Оцінка за **шкалою Сільвермана 9 балів**. Додаткова оксигенація не привела до покращення стану. Що необхідно зробити?

- А. Почати штучну вентиляцію легень під позитивним тиском
- В. Почати тактильну стимуляцію
- С. Почати інтубувати трахею
- Д. Почати штучну вентиляцію легень
- Е. Почати непрямий масаж серця

Дитина народилася при **терміні гестації 30 тижнів**, з масою - 1100,0, через 3 години після народження з'явилися **часті апное, дихання по типу "gasps", ЧСС 98** в хв. Оцінка за **шкалою Сільвермана 9 балів**. Додаткова оксигенація не привела до покращення стану. Що необхідно зробити?

А. Почати штучну вентиляцію легень під позитивним тиском

В. Почати тактильну стимуляцію

С. Почати інтубувати трахею

Д. Почати штучну вентиляцію легень

Е. Почати непрямий масаж серця

Доношена дівчинка народилася від II вагітності, яка перебігала з загрозою переривання на 25-27 тижнях, з хронічною фетоплацентарною недостатністю. Під час пологів було одноразове туге обвиття пуповини навколо шиї плода, утруднення виведення плечиків. Після народження дитина була оцінена за шкалою Апгар на першій хвилині: дихання відсутнє, ЧСС - 50/хв., тотальний ціаноз, атонія, арефлексія. Яка це оцінка за шкалою Апгар?

Доношена дівчинка народилася від II вагітності, яка перебігала з загрозою переривання на 25-27 тижнях, з хронічною фетоплацентарною недостатністю. Під час пологів було одноразове туге обвиття пуповини навколо шиї плода, утруднення виведення плечиків. Після народження дитина була оцінена за шкалою Апгар на першій хвилині: **дихання відсутнє, ЧСС - 50/хв., тотальний ціаноз, атонія, арефлексія**. Яка це оцінка за шкалою Апгар?

- A. 1 бал
- B. 3 бали
- C. 0 балів
- D. 4 бали
- E. 2 бали

Доношена дівчинка народилася від II вагітності, яка перебігала з загрозою переривання на 25-27 тижнях, з хронічною фетоплацентарною недостатністю. Під час пологів було одноразове туге обвиття пуповини навколо шиї плода, утруднення виведення плечиків. Після народження дитина була оцінена за шкалою Апгар на першій хвилині: **дихання відсутнє, ЧСС - 50/хв., тотальний ціаноз, атонія, арефлексія**. Яка це оцінка за шкалою Апгар?

A. 1 бал

B. 3 бали

C. 0 балів

D. 4 бали

E. 2 бали

У щойно народженої доношеної дитини, якій надають реанімаційну допомогу, після початкового періоду штучної вентиляції легень мішком і маскою ЧСС становить 50/хв. Звертають також на себе увагу тотальний ціаноз і відсутність самостійного дихання. Яким має бути наступний реанімаційний крок?

У щойно народженої доношеної дитини, якій надають реанімаційну допомогу, після початкового періоду штучної вентиляції легень мішком і маскою ЧСС становить 50/хв. Звертають також на себе увагу тотальний ціаноз і відсутність самостійного дихання. Яким має бути наступний реанімаційний крок?

- A. Розпочати непрямий масаж серця і відновити штучну вентиляцію легень
- B. Інтубувати трахею, ввести ендотра-хеально адреналін і відновити штучну вентиляцію легень
- C. Призначити кисневу терапію
- D. Продовжити штучну вентиляцію легень
- E. Катетеризувати вену пуповини і ввести адреналін

У щойно народженої доношеної дитини, якій надають реанімаційну допомогу, після початкового періоду штучної вентиляції легень мішком і маскою ЧСС становить 50/хв. Звертають також на себе увагу тотальний ціаноз і відсутність самостійного дихання. Яким має бути наступний реанімаційний крок?

- A. Розпочати непрямий масаж серця і відновити штучну вентиляцію легень
- B. Інтубувати трахею, ввести ендотра-хеально адреналін і відновити штучну вентиляцію легень
- C. Призначити кисневу терапію
- D. Продовжити штучну вентиляцію легень
- E. Катетеризувати вену пуповини і ввести адреналін